

MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 02.05. - 08.05.2024.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 683 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Betula* (184 pol. zr/m³ ili 26,94%), *Carpinus* (10 pol. zr/m³ ili 1,46%), *Juglans* (86 pol. zr/m³ ili 12,59%), *Pinaceae* (204 pol. zr/m³ ili 29,87%), *Salix* (107 pol. zr/m³ ili 15,67%) i *Tax/Jun* (92 pol. zr/m³ ili 13,47%).

TREND POLENA!!! POLEN ALARM

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske do umjerene koncentracije polena drveća (683 pol. zr/m³ zraka) i to: breze, graba, oraha, borova, vrba, tise i čempresa.

Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polen utvrđene su 02.05. (četvrtak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u nedjelju (05.05.2024).



DRVEĆE

683 zr/m³



TRAVE

0 zr/m³





KOROVI

0 zr/m³



Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergeni biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. S obzirom na promjenjive klimatske uslove i nestabilno vrijeme u narednoj sedmici se može očekivati blagi pad polena drvenastih biljaka, posebno polena breze i pojavu polena trava. Osobama koje su alergične na polen drveća preporučuje se da tokom proljeća (u vrijeme cvjetanja drveća), što više vremena provode u visokoplaninskom području, odnosno iznad granice šume.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Čet	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Ukupno
	Datum	02.05.	03.02.	04.05.	05.05.	06.05.	07.05.	08.05.	zr/m ³
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	184
Carpinus (grab)	.	.	.	X	.	.	X	X	10
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)	XX	XX	X	X	X	X	X	XX	86
Pinaceae (borovi)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	204
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)	XX	XX	X	X	X	X	X	XX	107
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)	XX	XX	X	X	X	X	X	XX	92
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	153	131	81	68	72	84	94	94	683
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šiševci)
Ukupno polena trava	0	0	0	0	0	0	0	.	0
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedmično variranje polena	153	131	81	68	72	84	94	94	683
UKUPNO pol. zr/m³									683

POLENSKA SKALA		KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)					Simptomi alergije se javljaju kod
		drveće	trave	korovi			
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10		izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50		puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500		većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500		svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergeni biljaka.