

MJERNA STANICA: Stari Grad

PERIOD: 01.08. - 07.08.2024.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Stari Grad konstatovano je 442 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća, trava i korova. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Pinaceae* (11 pol. zr/m³ ili 2,49%), *Tilia* (4 pol. zr/m³ ili 0,90%), *Poaceae* (231 pol. zr/m³ ili 52,26%), *Rumex* (42 pol. zr/m³ ili 9,50%), *Urticaceae* (100 pol. zr/m³ ili 22,62%), *Asteraceae* (4 pol. zr/m³ ili 0,90%) i *Plantaginaceae* (50 pol. zr/m³ ili 11,31%).

TREND POLENA!!!

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske koncentracije polena drveća (15 pol. zr/m³ zraka), visoke koncentracije polena trava (231 pol. zr/m³ zraka) i niske do umjerene koncentracije polena korova (196 pol. zr/m³ zraka). Polen drveća, trava i korova je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo). Visoke koncentracije polena utvrđene su 02.08. (petak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u utorak (06.08.2024).



DRVEĆE

15 zr/m³



TRAVE

231 zr/m³





KOROVI

196 zr/m³



Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Povećanje temperature znači i pojavu češćih alergija. Tokom naredne sedmice očekuje se povećanje koncentracije polena korova, a polen drveća i trava će blago opadati. Osobe alergične na polen korova trebaju izbjegavati neuređene i zapuštene površine.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								
Dan	Čet	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Ukupno
Datum	01.08.	02.08.	03.08.	04.08.	05.08.	06.08.	07.08.	zr/m ³
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)
Carpinus (grab)
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)	.	X	X	.	X	.	X	11
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)
Tilia (lipa)	X	.	.	.	X	.	.	4
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	2	3	4	0	4	0	2	15
Poaceae (trave)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	231
Cyperaceae (šiševci)
Ukupno polena trava	37	38	32	29	28	32	35	231
KOROVI								
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)	X	X	X	X	X	X	X	42
Urticaceae (žare)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	100
Asteraceae (glavočike)	X	.	.	4
Plantaginaceae (bokvice)	X	X	X	X	X	X	X	50
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova	28	31	31	30	26	23	27	196
Sedmično variranje polena	67	72	67	59	58	55	64	442
UKUPNO pol. zr/m³								442

POLENSKA SKALA		KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)				
		drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod	
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergeni biljaka.