


**MJERNA STANICA: Pofalići****PERIOD: 31.07. – 06.08.2020.****Koncentracija polena:**

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 1060 pol. zr/m<sup>3</sup>. Polen pripada skupini trava i korova. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: Poaceae (83,53%), Ambrosia (9,69%), Pinaceae (3,39%), Asteraceae (2,92%) i Rumex (0,47%).

**TREND POLENA !!! POLEN ALARM !!!**

Tokom protekle sedmice konstatovane su visoke koncentracije polena trave (1060 pol. zr/m<sup>3</sup> zraka), te niske do srednje visoke koncentracije polena polena korova (166 pol. zr/m<sup>3</sup> zraka). Polen trava i korova je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polen utvrđene su 06.08. (četvrtak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u petak (06.08.2020).




Ambrozija (korovi)

Urticaceae (korovi)

Poaceae (trave)

% udio polena alergenih biljaka

**Prognoza, savjeti i preporuke:**

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Pol. kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trave, te povećane koncentracije polena alergene biljke *A.artemisiifolia* L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	31.07.	01.08.	02.08.	03.08.	04.08.	05.08.	06.08.	zr/m <sup>3</sup>
<b>DRVEĆE</b>									
Acer (javor)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Aesculus (divlji kesten)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Alnus (joha)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Betula (breza)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus (grab)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Castanea (pitomi kesten)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Corylus (lijeska)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagus (bukva)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus (jasen)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juglans (orah)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pinaceae (borovi)	X	X	X	X	X	X	X	X	43
Platanus (platan)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Populus (topola)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Quercus (hrast)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix (vrba)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus (zova)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tax/Jun	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia (lipa)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulmus (brijest)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena drveća</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	.	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	
<b>TRAVE</b>									
Poaceae (trave)	XXX	1060							
Cyperaceae (šaševi)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena trave</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>157</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>170</b>	<b>1060</b>	
<b>KOROVI</b>									
Ambrosia (ambrozija)	XX	123							
Artemisia (pelin)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex (kiselica)	X	.	X	.	.	.	.	.	6
Urticaceae (žare)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asteraceae (glavočike)	.	X	X	X	X	X	X	X	37
Plantaginaceae (bokvice)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chenopodiaceae (lobodnjачe)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena korova</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>166</b>	
<b>Sedmično variranje polena</b>	<b>165</b>	<b>197</b>	<b>196</b>	<b>187</b>	<b>148</b>	<b>158</b>	<b>218</b>		<b>1269</b>
<b>UKUPNO pol. zr/m<sup>3</sup></b>									

#### KONCENTRACIJA POLENA (zr/m<sup>3</sup>)

POLENSKA SKALA		drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10 izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50 puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500 većine alergičnih osoba
XXXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500 svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

**NAPOMENA:**

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergenih biljaka.